

Primeros pasos con KERENDIA (finerenone)

Asumimos el compromiso
de ayudarle a comenzar
y continuar con la terapia



Kerendia[®]
(finerenone) tablets
10 mg - 20 mg

Tarjeta de
ahorro de
copagos de
KERENDIA
incluida en
el interior



Si tiene preguntas sobre KERENDIA y los apoyos financieros y para pacientes, llame al **1-888-KERENDIA (537-3634)** o ingrese a **es.KERENDIA.com**

Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA en las páginas 26-27.

Su tarjeta de ahorro de copagos de KERENDIA



LOS PACIENTES ELEGIBLES PUEDEN
PAGAR SOLO \$0
POR MES*

Recibir y activar una tarjeta de ahorro de KERENDIA es sencillo.
Consulte con su médico o haga lo siguiente:

- 1 Llame al **1-888-537-3634**
- 2 Envíe un mensaje con la palabra **AHORRAR** al 53736†
- 3 Ingrese a **KERENDIASavings.com**



*Los pacientes son elegibles si tienen seguro comercial y pueden llegar a pagar tan solo \$0, con lo que ahorrarán hasta \$3,000 por año. No son elegibles los pacientes que estén inscritos en algún tipo de seguro o programa de reembolso del gobierno. Se aplican todos los términos y condiciones; visite www.KERENDIASavings.com.

†Al enviar un mensaje de texto con la palabra AHORRAR al 53736 para inscribir o activar su tarjeta, usted acepta recibir mensajes automáticos periódicos del Programa de ahorro de KERENDIA, que pueden incluir alertas de ahorro, recordatorios para la reposición y otros mensajes relacionados con su participación en el programa. El consentimiento para recibir mensajes SMS no es una condición de compra de bienes o servicios. Pueden aplicarse tarifas de mensajería o de datos. La frecuencia de los mensajes varía. Envíe un mensaje de texto con la palabra DETENER para cancelarlos. Envíe un mensaje de texto con la palabra AYUDA para solicitar ayuda. Se aplican los términos y condiciones y la política de privacidad.

Contenido

El comienzo del tratamiento	04
¿Por qué KERENDIA?	06
Datos clínicos	08
¿Cómo funciona KERENDIA?	10
El tratamiento con KERENDIA	12
La continuación del tratamiento	16
Apoyo	18
Preguntas frecuentes	22
Recursos	24
Datos importantes de KERENDIA	26

Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA en las páginas 26-27.

El proceso de su tratamiento con KERENDIA está por comenzar



*Los comprimidos no son del tamaño real.

Como paciente que comienza el tratamiento con KERENDIA, está dando un paso importante para controlar su afección. Estamos aquí para ayudar.

En las siguientes páginas, esperamos darle una idea de cómo podría ser el proceso de su tratamiento y describirle todas las herramientas y recursos que se ofrecen para ayudarle a comenzar la terapia y continuarla.

Pero antes, hablemos de por qué es importante tratar la enfermedad renal crónica en la diabetes tipo 2 (CKD en T2D).

¿Qué es la CKD en T2D?

En los adultos con diabetes tipo 2 (T2D), la enfermedad renal crónica (CKD) es una afección en la que se produce una pérdida gradual de la función renal, lo que a su vez puede dar lugar a un daño permanente a los riñones, insuficiencia renal, diálisis y trasplante de riñón.



La CKD también puede dar lugar a problemas cardiovasculares, como un ataque cardíaco



Información importante de seguridad

No tome KERENDIA si usted:

- Tiene problemas en sus glándulas suprarrenales.
- Toma ciertos medicamentos llamados inhibidores de CYP3A4. Consulte con su médico si no está seguro de estar tomando alguno de estos medicamentos.

Indicación

¿Qué es KERENDIA?

KERENDIA es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar la enfermedad renal crónica en adultos con diabetes de tipo 2 para reducir los siguientes riesgos:

- Aggravamiento de la enfermedad renal
- Insuficiencia renal
- Muerte como consecuencia de una enfermedad cardiovascular
- Ataque cardíaco
- Hospitalización por insuficiencia cardíaca

Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA en las páginas 26-27.

¿Por qué KERENDIA?

¿Por qué su médico le recetó KERENDIA?

A partir de su diagnóstico de enfermedad renal crónica en la diabetes tipo 2 (CKD en T2D), su médico considera que KERENDIA es el tratamiento adecuado para ayudar a manejar su afección.



¿Qué es KERENDIA?

KERENDIA es un medicamento de venta con receta que se toma una vez al día para tratar a adultos con CKD en T2D y reducir los siguientes riesgos:

- > Agravamiento de la enfermedad renal



Está demostrado que KERENDIA retrasa la progresión de la CKD en T2D y que reduce el riesgo de insuficiencia renal.

Además de ayudar a proteger los riñones, se demostró que KERENDIA reduce los siguientes riesgos:



- > Muerte como consecuencia de una enfermedad cardiovascular
- > Ataque cardíaco
- > Hospitalización por insuficiencia cardíaca

ⓘ Información importante de seguridad (cont.)
Antes de tomar KERENDIA, infórmelo a su médico todos sus problemas de salud, incluso en los siguientes casos:

- Si tiene niveles altos de potasio en sangre (hiperpotasemia) o toma medicamentos que pueden aumentar los niveles de potasio en sangre. KERENDIA puede provocar hiperpotasemia. Su médico controlará sus niveles de potasio antes y durante el tratamiento con KERENDIA.
- Si tiene problemas hepáticos graves.
- Si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada, o bien si está dando el pecho o tiene planes de hacerlo. Evite dar el pecho durante el tratamiento con KERENDIA y 1 día después del tratamiento.

Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA en las páginas 26-27.

Los datos clínicos respaldan a KERENDIA

En un estudio clínico, KERENDIA retrasó la progresión de la enfermedad renal crónica (CKD) en adultos con CKD en la diabetes tipo 2 (T2D)*

*Se evaluaron la eficacia y la seguridad de KERENDIA para mejorar la respuesta en los riñones y el corazón en un estudio realizado en adultos con CKD en T2D. En este estudio, 5,674 pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir KERENDIA o un placebo.

Se demostró que KERENDIA:



- Retrasa la pérdida de la función renal
- Reduce el riesgo de insuficiencia renal

! Información importante de seguridad (cont.)

Infórmele a su médico todos los medicamentos con receta y de venta libre que tome, incluidos sustitutos de la sal, vitaminas y suplementos a base de hierbas o con potasio.

- KERENDIA puede afectar la forma en que otros medicamentos actúan, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que KERENDIA actúa. No comience ni abandone tratamientos con medicamentos sin hablarlo con su médico. Evite comer toronja o beber su jugo, ya que esto puede aumentar los niveles de KERENDIA en sangre.



KERENDIA también disminuyó el riesgo de eventos cardiovasculares en adultos con CKD en T2D†

†Se evaluaron la eficacia y la seguridad de KERENDIA para mejorar la respuesta en los riñones y el corazón en un estudio realizado en adultos con CKD en T2D. En este estudio, 5,674 pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir KERENDIA o un placebo.

KERENDIA disminuyó los siguientes riesgos:



- Ataque cardíaco
- Muerte cardiovascular
- Hospitalización por insuficiencia cardíaca

Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA en las páginas 26-27.

En adultos con enfermedad renal crónica en la diabetes tipo 2 (CKD en T2D)


KERENDIA combate la CKD de un modo distinto al de los medicamentos para la diabetes.

Podría haber algo más que pueda hacer para proteger sus riñones y retrasar el daño que puede dar paso a la diálisis o a un trasplante de riñón


KERENDIA no reemplaza sus medicamentos para la diabetes y la hipertensión arterial; por eso, si ya está tomando medicamentos para la diabetes y la hipertensión arterial, hay algo más que puede hacer para proteger sus riñones y retrasar el daño que puede dar paso a la diálisis o a un trasplante de riñón.

Aunque los medicamentos para la diabetes y la hipertensión arterial pueden ayudar a controlar la glucosa y la presión arterial, **KERENDIA es el único medicamento de su tipo que bloquea la hiperactivación de los receptores mineralocorticoides (MR)** en los riñones, el corazón y los vasos sanguíneos.

La hiperactivación de los MR puede provocar inflamación y esclerosis en los riñones, el corazón y los vasos sanguíneos



KERENDIA se une a los MR



KERENDIA bloquea la hiperactivación de MR



La hiperactivación de los MR puede contribuir a la inflamación y la esclerosis que pueden dar lugar a la progresión de la enfermedad renal y también podría agravar su enfermedad cardiovascular. Se considera que el bloqueo de los MR retrasa la progresión de la CKD en la diabetes de tipo 2.



Información importante de seguridad (cont.)

Los efectos secundarios más frecuentes de KERENDIA incluyen:

- Hiperpotasemia (un nivel de potasio en la sangre que es más alto que lo normal)
- Hipotensión (presión arterial que es más baja que lo normal)
- Hiponatremia (un nivel de sodio en la sangre que es más bajo que lo normal)

Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA en las páginas 26-27.

¿Qué debería esperar al comenzar el tratamiento con KERENDIA?



Antes de indicarle que comience el tratamiento con KERENDIA, el médico le pedirá que se haga algunos análisis. Estos análisis permitirán que su médico sepa con qué dosis comenzar. Después de unas semanas de tratamiento con KERENDIA, el médico le indicará otros análisis para comprobar si es necesario hacer ajustes de dosis.

Los análisis de rutina son importantes para determinar la dosis adecuada de KERENDIA para usted

- 1 Cuando haya comenzado el tratamiento con KERENDIA, su médico le controlará periódicamente los niveles de potasio en sangre y su velocidad de filtración glomerular estimada (eGFR).
- 2 Estos controles sirven para asegurarse de que usted está recibiendo la dosis correcta de KERENDIA y para controlar su función renal.
- 3 Cuando su médico tenga los resultados del laboratorio, podría ajustar su dosis según sea necesario.
- 4 El médico seguirá controlando sus niveles de potasio y la eGFR periódicamente para asegurarse de que usted está recibiendo la dosis correcta de KERENDIA.



Tomar un papel activo en su tratamiento le puede ayudar a comprender las decisiones que toma su médico: no dude en hacer preguntas sobre los resultados de sus análisis y su tratamiento

¿Preguntas para su médico?

Anótelas aquí para no olvidar hacerlas en la próxima cita. Si busca sugerencias, consulte nuestra sección de Preguntas frecuentes en la página 22.



Información importante de seguridad

No tome KERENDIA si usted:

- Tiene problemas en sus glándulas suprarrenales.
- Toma ciertos medicamentos llamados inhibidores de CYP3A4. Consulte con su médico si no está seguro de estar tomando alguno de estos medicamentos.

Indicación

¿Qué es KERENDIA?

KERENDIA es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar la enfermedad renal crónica en adultos con diabetes de tipo 2 para reducir los siguientes riesgos:

- Agravamiento de la enfermedad renal
- Insuficiencia renal
- Muerte como consecuencia de una enfermedad cardiovascular
- Ataque cardíaco
- Hospitalización por insuficiencia cardíaca

Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA en las páginas 26-27.

¿Cómo se toma KERENDIA?

Tomar KERENDIA de manera adecuada le permite asegurarse de recibir el mayor beneficio de su tratamiento

Esto es lo que necesita saber:



KERENDIA es un comprimido que se toma una vez al día. Debe tragar el comprimido entero, con o sin alimentos.



Si no puede tragar el comprimido entero, KERENDIA se puede triturar y mezclar con agua o alimentos blandos, como el puré de manzana, inmediatamente antes de administrarse por vía oral.



Es importante que evite comer toronja o beber su jugo, ya que esto puede aumentar los niveles de KERENDIA en sangre.



Si omite una dosis de KERENDIA, tome la dosis indicada tan pronto como lo recuerde antes de la próxima dosis programada. **No tome 2 dosis el mismo día para compensar una dosis omitida.**



Tome KERENDIA como le indicaron y no comience ni abandone tratamientos con medicamentos sin hablarlo con su médico, incluidos los medicamentos para la diabetes y la hipertensión arterial. Consulte con su médico o farmacéutico si no está seguro.



Infórmele a su médico todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, los sustitutos de la sal, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas o con potasio. KERENDIA puede afectar la forma en que otros medicamentos actúan, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que KERENDIA actúa.



Información importante de seguridad (cont.)

Antes de tomar KERENDIA, infórmele a su médico todos sus problemas de salud, incluso en los siguientes casos:

- Si tiene niveles altos de potasio en sangre (hiperpotasemia) o toma medicamentos que pueden aumentar los niveles de potasio en sangre. KERENDIA puede provocar hiperpotasemia. Su médico controlará sus niveles de potasio antes y durante el tratamiento con KERENDIA.
- Si tiene problemas hepáticos graves.
- Si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada, o bien si está dando el pecho o tiene planes de hacerlo. Evite dar el pecho durante el tratamiento con KERENDIA y 1 día después del tratamiento.



Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA en las páginas 26-27.

Efectos secundarios frecuentes de KERENDIA

A continuación, se presentan los efectos secundarios más frecuentes de KERENDIA.

Hiperpotasemia

Un nivel de potasio en la sangre que es más alto que lo normal

Hipotensión

Presión arterial que es más baja que lo normal

Hiponatremia

Un nivel de sodio en la sangre que es más bajo que lo normal

Si experimenta algún efecto secundario, debe notificarlo a su médico de inmediato. Su médico puede cambiar la dosis de ser necesario.



No deje de tomar KERENDIA sin consultarlo con su médico

ⓘ Información importante de seguridad (cont.)

Infórmele a su médico todos los medicamentos con receta y de venta libre que tome, incluidos sustitutos de la sal, vitaminas y suplementos a base de hierbas o con potasio.

- KERENDIA puede afectar la forma en que otros medicamentos actúan, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que KERENDIA actúa. No comience ni abandone tratamientos con medicamentos sin hablarlo con su médico. Evite comer toronja o beber su jugo, ya que esto puede aumentar los niveles de KERENDIA en sangre.

Es muy importante que no interrumpa el tratamiento

- 1 Está demostrado que KERENDIA retrasa significativamente la progresión de la enfermedad renal crónica en la diabetes tipo 2 (CKD en T2D).
- 2 La CKD en T2D es una enfermedad progresiva, lo que significa que no se puede curar y que el daño a los riñones no se puede revertir. Sin tratamiento, la CKD seguirá empeorando. A medida que empeore, la CKD puede dar lugar a una insuficiencia renal, lo que requerirá diálisis o un trasplante de riñón.
- 3 La CKD en T2D no tiene síntomas hasta que está en una etapa avanzada. Es por eso que es importante llevar el control de sus análisis y de su estado de salud con el médico.



Hay varios programas y recursos que pueden ayudarle a seguir adelante con el tratamiento; hablaremos de ellos con más detalle en las siguientes páginas

Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA en las páginas 26-27.

El Programa de apoyo al paciente de KERENDIA está aquí para usted

Asumimos el compromiso de ayudar para que pueda superar los obstáculos financieros, del seguro o de asequibilidad. Esto incluye:



Un equipo de ayuda para que pueda comprender los beneficios del seguro para KERENDIA y para superar los obstáculos financieros o los relacionados con el seguro



Mensajes por correo electrónico que le servirán de guía en su proceso de tratamiento con KERENDIA mediante noticias, información e historias de otros pacientes que toman KERENDIA



Llamadas telefónicas, mensajes por correo electrónico o mensajes de texto de un mentor personal, quien le brindará ayuda con información y apoyo cuando comience con el tratamiento



KERENDIA Digital Companion (acompañante digital de KERENDIA) en la aplicación Medisafe® ayuda a los pacientes que toman KERENDIA a administrar su tratamiento mediante recordatorios personalizados de medicaciones y citas, información relacionada con el tratamiento y su afección, y mucho más



Estamos aquí para darle nuestro apoyo. Ingrese a [es.KERENDIA.com](https://es.kerendia.com) para descargar algunas de nuestras útiles herramientas de apoyo para pacientes.

Descargue la aplicación Medisafe®, que le servirá de ayuda para administrar su tratamiento y a continuarlo según lo planeado

Queremos asegurarnos de que tenga la ayuda que necesite, cuando la necesite. Por ello, desarrollamos KERENDIA Digital Companion (acompañante digital de KERENDIA) en la aplicación Medisafe®. Esto incluye:

- Recordatorios de medicaciones y reposición de recetas
- Recursos e información sobre KERENDIA y la enfermedad renal crónica en la diabetes tipo 2
- Recordatorios personalizados de las citas para cada visita al médico
- Herramientas para hacer el seguimiento de los resultados de sus análisis eGFR y UACR

Para comenzar a usar KERENDIA Digital Companion, descargue la aplicación Medisafe® escaneando el código QR (o ingrese en App Store o en Google Play Store).

- 1 Toque “Get started” (Comenzar)
- 2 Agregue a KERENDIA a su botiquín
- 3 Cree recordatorios personalizados

App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google L.L.C. Medisafe® es una marca comercial registrada de Medisafe® Project LTD.

Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA en las páginas 26-27.



Asumimos el compromiso de ayudar para que pueda superar los obstáculos financieros, del seguro o de asequibilidad



KERENDIA Live Helpline Support (línea directa de ayuda en vivo) está tan cerca de usted como su teléfono



Hable con un experto en seguros médicos que le brindará ayuda con las preguntas que pudiera tener sobre la cobertura del seguro para KERENDIA



Se encuentra disponible la asistencia en varios idiomas, incluido el español:
1-888-KERENDIA (537-3634)
de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. hora del Este, de lunes a viernes



Información importante de seguridad (cont.)

Los efectos secundarios más frecuentes de KERENDIA incluyen:

- Hiperpotasemia (un nivel de potasio en la sangre que es más alto que lo normal)
- Hipotensión (presión arterial que es más baja que lo normal)
- Hiponatremia (un nivel de sodio en la sangre que es más bajo que lo normal)

Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA en las páginas 26-27.



Preguntas frecuentes

¿Qué es la enfermedad renal crónica en la diabetes de tipo 2 (CKD en T2D)?

Si usted padece T2D, puede tener inflamación y esclerosis, lo que ocasiona daños en los riñones. Con el tiempo, esto puede dar lugar a la enfermedad renal crónica, que implica una pérdida gradual de la función renal y puede producir daño permanente a los riñones. Este daño a los riñones puede dar paso a la insuficiencia renal, la diálisis y el trasplante de riñón. Además, la CKD en T2D puede provocar otros problemas graves de salud. Por ejemplo, si usted tiene CKD en T2D, tiene **3 veces** más posibilidades de morir por un evento cardiovascular, como un ataque cardíaco, que las personas que solo tienen T2D.

¿La CKD desaparece en algún momento?

La enfermedad se llama crónica porque el daño a los riñones se produce a lo largo del tiempo y porque es una enfermedad progresiva: esto significa que empeora con el tiempo. Cuanto antes se diagnostique la CKD, más posibilidades habrá de proteger los riñones de daños mayores.

¿Por cuánto tiempo tendré que tomar KERENDIA?

Se le indicó tomar KERENDIA porque su médico determinó que es el tratamiento indicado para usted, ya que está demostrado que KERENDIA retrasa la progresión de la CKD en T2D y que reduce el riesgo de insuficiencia renal en adultos con CKD en T2D. Cuanto antes se diagnostique la CKD, más posibilidades habrá de proteger los riñones de daños mayores. Consulte a su médico por cuánto tiempo necesitará tratamiento con KERENDIA. Su médico es la persona más indicada para preguntarle sobre la CKD en T2D y sobre el tratamiento con KERENDIA.

¿Puedo tomar KERENDIA con mis otros medicamentos?

Infórmele a su médico todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, los sustitutos de la sal, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas o con potasio. KERENDIA puede afectar la forma en que otros medicamentos actúan, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que KERENDIA actúa.



Información importante de seguridad (cont.)

No tome KERENDIA si usted:

- Tiene problemas en sus glándulas suprarrenales.
- Toma ciertos medicamentos llamados inhibidores de CYP3A4. Consulte con su médico si no está seguro de estar tomando alguno de estos medicamentos.

Tome KERENDIA como le indicaron y no comience ni abandone tratamientos con medicamentos sin hablarlo con su médico.

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes a los que debería prestar atención?

Los efectos secundarios más frecuentes de KERENDIA incluyen:

- Hiperpotasemia (un nivel de potasio en la sangre que es más alto que lo normal)
- Hipotensión (presión arterial que es más baja que lo normal)
- Hiponatremia (un nivel de sodio en la sangre que es más bajo que lo normal)

¿Qué debo hacer si creo que estoy teniendo efectos secundarios?

Si experimenta algún efecto secundario, debe notificarlo a su médico de inmediato. Su médico puede cambiar la dosis de ser necesario.

Llame a su médico para obtener orientación sobre los efectos secundarios. Además, puede informar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) llamando al **1-800-FDA-1088**. **No deje de tomar KERENDIA sin consultarlo con su médico.**

¿Qué debo hacer si omito una dosis?

Si omite una dosis de KERENDIA, tome la dosis indicada tan pronto como lo recuerde. **No tome 2 dosis el mismo día para compensar una dosis omitida.**

¿Cómo debo conservar KERENDIA?

Conserve KERENDIA a temperatura ambiente, entre 68 °F y 77 °F (entre 20 °C y 25 °C).

¿Hay organizaciones de apoyo que ayuden a personas con mi afección?

Sí, consulte la página 25 de este folleto.



Información importante de seguridad (cont.)

Antes de tomar KERENDIA, infórmele a su médico todos sus problemas de salud, incluso en los siguientes casos:

- Si tiene niveles altos de potasio en sangre (hiperpotasemia) o toma medicamentos que pueden aumentar los niveles de potasio en sangre. KERENDIA puede provocar hiperpotasemia. Su médico controlará sus niveles de potasio antes y durante el tratamiento con KERENDIA.
- Si tiene problemas hepáticos graves.
- Si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada, o bien si está dando el pecho o tiene planes de hacerlo. Evite dar el pecho durante el tratamiento con KERENDIA y 1 día después del tratamiento.

Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA en las páginas 26-27.

Mantenga el diálogo abierto con estas preguntas sugeridas para su médico



Es importante seguir aprendiendo sobre su enfermedad; aprovechar al máximo su tiempo con el médico es una forma de lograrlo. Estas son algunas preguntas que puede hacer para iniciar la conversación. Anótelas en la página 13 y llévelas junto con los resultados impresos de sus análisis.

- > ¿Cómo puedo saber si KERENDIA está funcionando?
- > ¿Empeoró mi función renal desde mi última visita?
- > ¿Veré cambios en mis análisis de velocidad de filtración glomerular estimada (eGFR) y cociente albúmina/creatinina en orina (UACR)?
- > ¿Mis familiares con diabetes tipo 2 tienen mayor riesgo de desarrollar CKD?
- > ¿Qué pueden hacer mis familiares con diabetes tipo 2 para proteger la salud de sus riñones?



Su médico debe ser la primera persona que consulte si tiene preguntas sobre su tratamiento

Esta es una lista de grupos de apoyo y sitios web de utilidad

American Association of Kidney Patients (AAKP)

La AAKP, que es la organización independiente de pacientes renales más grande y antigua de los Estados Unidos, se dedica a mejorar las vidas y los desenlaces a largo plazo de los pacientes renales a través de la educación, la defensa de intereses, el involucramiento de los pacientes y el fomento de comunidades de pacientes.
aakp.org

Asociación Americana de la Diabetes (ADA)

Un recurso valioso de información para pacientes con diabetes y sus cuidadores.
diabetes.org

National Kidney Foundation (NKF)

La NKF se dedica a mejorar la vida de las personas que tienen enfermedad renal a través de iniciativas de educación y defensa de los intereses.
kidney.org

American Kidney Fund (AKF)

AKF ofrece a los pacientes muchos programas valiosos orientados a la prevención, la detección temprana, el apoyo financiero, la investigación y la defensa de intereses.
kidneyfund.org

Know Diabetes by Heart

Una iniciativa de colaboración entre la American Heart Association y la Asociación Americana de la Diabetes, entre otras, para crear conciencia sobre el vínculo entre la diabetes y la enfermedad cardiovascular, y para motivar a las personas para que controlen mejor su riesgo de enfermedad cardiovascular, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular.
KnowDiabetesbyHeart.org

Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK)

El NIDDK lleva a cabo y financia investigaciones médicas en los campos de la diabetes, la enfermedad renal y muchos otros, con las que presenta información valiosa de la salud al público en general.
nidDK.nih.gov

Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA en las páginas 26-27.



Datos importantes de KERENDIA (finerenone)

Acerca de KERENDIA

KERENDIA es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar la enfermedad renal crónica en adultos con diabetes tipo 2 para reducir los siguientes riesgos:

- Agravamiento de la enfermedad renal
- Insuficiencia renal
- Muerte como consecuencia de una enfermedad cardiovascular
- Ataque cardíaco
- Hospitalización por insuficiencia cardíaca

¿Quiénes no deben tomar KERENDIA?

- Los pacientes que tengan problemas en sus glándulas suprarrenales
- Los pacientes que tomen ciertos medicamentos llamados inhibidores de CYP3A4. Consulte con su médico si no está seguro de estar tomando alguno de estos medicamentos.

Advertencias sobre KERENDIA

KERENDIA puede hacer que aumenten los niveles de potasio en la sangre (hiperpotasemia). Su médico controlará sus niveles de potasio y la función renal antes de empezar y durante el tratamiento con KERENDIA. Antes de tomar KERENDIA, infórmele a su médico si tiene niveles altos de potasio en la sangre o si toma medicamentos que pueden aumentar los niveles de potasio en sangre.

Antes de comenzar el tratamiento con KERENDIA

Infórmele a su médico lo siguiente:

Consulte la Información importante de seguridad completa y los Datos importantes de KERENDIA en las páginas 26-27.

- Si tiene problemas hepáticos graves.
- Si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada, o bien si está dando el pecho o tiene planes de hacerlo. Evite dar el pecho durante el tratamiento con KERENDIA y 1 día después del tratamiento.
- Si toma medicamentos de venta con receta y de venta libre, sustitutos de la sal, vitaminas y suplementos a base de hierbas o con potasio.

Lo que debe saber mientras toma KERENDIA

- KERENDIA puede afectar la forma en que otros medicamentos actúan, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que KERENDIA actúa. No comience ni abandone tratamientos con medicamentos sin hablarlo con su médico.
- Evite comer toronja o beber su jugo, ya que esto puede aumentar los niveles de KERENDIA en sangre.

Posibles efectos secundarios de KERENDIA

Los efectos secundarios más frecuentes que se observaron en personas que recibieron KERENDIA fueron:

- Hiperpotasemia (un nivel de potasio en la sangre que es más alto que lo normal)
- Hipotensión (presión arterial que es más baja que lo normal)
- Hiponatremia (un nivel de sodio en la sangre que es más bajo que lo normal)



Infórmele a su médico si presenta algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca.

La información sobre los riesgos que se presenta aquí no es exhaustiva.

Cómo encontrar más información:

- Consulte a su médico o farmacéutico.
- Ingrese a es.Kerendia.com para obtener el etiquetado del producto aprobado por la FDA
- Llame al 1-888-KERENDIA

Se recomienda que notifique los efectos secundarios o las quejas relacionadas con la calidad de los productos a la FDA.

Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.



Estamos aquí para ayudar. Ingrese a es.KERENDIA.com para acceder a formas de ahorro y apoyo.



Preguntas y apoyo

Si tiene preguntas sobre KERENDIA o los apoyos financieros y para pacientes, llame al **1-888-KERENDIA (537-3634)**



© 2022 Bayer Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados.
BAYER, la Cruz de Bayer y KERENDIA son marcas comerciales registradas de Bayer.
PP-KER-US-0406-1 02/2022



Kerendia[®]
(finerenone) tablets
10 mg - 20 mg